"Guida per i pazienti: cosa sapere prima di un esame con mezzo di contrasto"

Per eseguire l'esame in sicurezza, è necessario effettuare prima una valutazione con il nostro personale medico. Senza questo passaggio, non sarà possibile procedere con l'indagine.

- ✓ **ESAME DI LABORATORIO: creatininemia, creatinina clearance;**
- ✓ **ELETTROCARDIOGRAMMA REFERTATO;**
- ✓ **PORTARE IN VISIONE LA RICHIESTA DEL MEDICO SPECIALISTA O DEL MEDICO CURANTE;**
- ✓ **ESSERE A DIGIUNO DA CIBO DA ALMENO 6 ORE E DA LIQUIDI CHIARI (acqua, thè, caffè)**
- ✓ **DA ALMENO 2 ORE (è consentito bere al fine di assumere medicinali in caso di terapie in**
- ✓ **corso che non vanno mai sospese).**

ATTENZIONE! L'ESAME NON PUÒ ESSERE ESEGUITO PRESSO LA STRUTTURA IN CASO DI:

1. **ACCERTATA REAZIONE ALLERGICA AL MEZZO DI CONTRASTO;**
2. **ASMA NON CONTROLLATA;**
3. **ORTICARIA O ANGIOEDEMA CRONICI/RICORRENTI NON CONTROLLATI;**
4. **MASTOCITOSI;**
5. **PREGRESSA ANAFILASSI IDIOPATICA (non nota la causa scatenante);**

NON RAPPRESENTANO FATTORI DI RISCHIO:

1. PREGRESSA REAZIONA AVVERSA AD ALIMENTI (ad es. molluschi, crostacei, frutta etc.);
2. POLLINI, PIANTE, POLVERI, METALLI ETC.;
3. PREGRESSA REAZIONE ALLERGICA A FARMACI (ad es. antibiotici, antinfiammatori etc.);
4. REAZIONI DI IPERSENSIBILITA' AD ANTISETTICI IODATI (ad es. iodopovidone, iodoformio etc.).

ATTENZIONE SOLO IN CASO DI ENTERO RM

"Oltre a quanto indicato sopra, portare con sé 1,5 L di acqua e due bustine di COLON PEG (da assumere 30 minuti prima dell'esame, seguendo le indicazioni del personale). Durante l'esame sarà somministrato un antispastico (Buscopan 1 fl) per ridurre la peristalsi intestinale"

Per informazioni o chiarimenti, potete contattarci ai numeri:

☎ 0825-772111 +39 375 668 8901

"Grazie per aver scelto la nostra clinica."